



Una ciudad Griega ocupada por los Aliados

demanda), hay varias clases: unas de enredadera y otras de *arbusculo*, cuyas diferencias consisten en la figura del grano, en el tiempo que exigen para la producción, en la mayor o menor resistencia al ataque del gorgojo, y por último, en la cantidad de almidón y dextrina que contienen.

Entre las variedades enanas las que gustan más son las conocidas con los nombres de *temprano de Mont d'Or* y *temprano de Dijon*, las cuales abundan mucho en Sur América y aun se cree que son originarias de este Continente, a pesar de los nombres extranjeros con que las denominan.

En la Argentina y en algunos Estados, mejicanos llaman *balines blancos* a los que aquí conocemos con el nombre de *huesitos* y *enredaderas*. Esos son muy apreciados, porque su cocción es fácil y porque tienen muchas sustancias azoadas.

ando a la muerte apenas se le pone delante uno de sus ministros o precursores.

CAPÍTULO XX

¿Qué será mejor? entre servir a caballeros o a gente rústica

VIVIENDO en tanto retiro y sosiego, combatía el fastidio de mis largos ocios repasando los sucesos de mi vida y rumiando las especies que de las conversaciones con mis amigos me habían quedado más grabadas en la memoria. Mi actual situación me hizo pensar en ciertos coloquios y discusiones en que se había ventilado esta cuestión: ¿Qué le conviene más a un caballo, servir a personas de alcurnia, ricas y delicadas, o pertenecer a gente campesina y humilde?

Yo había oído exponer razones de mucho peso a los que sostenían que la suerte de los caballos de la gente acomodada era preferible a la de los

La Sociedad de Agricultores en vista del alto precio que tienen los frijoles en los Estados Unidos, hizo gestiones para conseguir semillas de muestra, y obtuvo de tres clases. Luego averiguó, por cable, cual de ellos tenía mayor demanda y mejor precio y le contestaron de Nueva York: «largos, forma de riñón».

Pero a la Sección exportadora del Banco de Colombia le indicaron, después de conocer semillas colombianas, enviadas con carácter de muestra, que los ovalados eran los preferidos.

En todo caso podemos asegurar que los frijoles blancos, pequeños o medianos, largos u ovalados, de arbolito o de enredadera, tienen buena aceptación en los Estados Unidos y se cotizan hoy alrededor de 15 centavos la libra (hasta 19 ha subido el precio).

Lo que importa para las siembras es escoger semillas frescas y saber

otros. Así lo sentía Morgante; pero en este punto su dictamen no era de tanto peso como en otros, porque ¿cómo podía él comparar la situación de que su buena suerte no lo había dejado decaer nunca, con la de las bestias de los pobres? «El caballo», decía él, que se halla en poder de un labriego, está sujeto a las mismas estrecheces que su dueño, pasa por los altibajos que él, y naturalmente ha de verse abrumado con un trabajo mayor que el que tiene que sobrellevar el caballo de un rico.»

Continuará

Información Comercial

(mercado de Bogotá)

Caño - Cueros Arroz Manteca
23 24 4,80

Algodón desmotado de 22 a 24 libra

si ellas proceden de *arbusculo* o de enredadera, pues en el segundo caso es preciso sembrarlas con el maíz, para que las cañas de éste sirvan de sostén. En algunas partes de Colombia siembran también en rastrojos malos, previamente rozados por la parte superior, para dejar apenas las varas en donde pueda enredar el frijol.

Por supuesto que de esta clase de cultivos, hechos a la ligera, para economizar gastos y tiempo, no se pueden esperar sino productos esca-

Siembra

El frijol es indudablemente una de las leguminosas más delicadas, y su cultivo, para que dé buen rendimiento, exige cuidados especiales. Conviene remover la tierra donde se va a sembrar, pues la raíz del frijol es débil y no penetra fácilmente. Para cultivos extensos, deben preferirse las variedades enanas (de *arbusculo*), pues el problema de los sostenes, en los de enredadera, es de difícil resolución cuando no se puede sembrar maíz, por circunstancias de tiempo. Pero si esto fuere posible, debe preferirse el frijol de enredadera porque su producción es dos veces mayor que la del otro.

El método acostumbrado en la siembra de la variedad enana es el de hileras paralelas, distanciadas a cincuenta centímetros; las semillas (tres en cada puesto) se colocan en la fila, con unos diez centímetros de puesto a puesto y se las cubre con una capa de tierra que sea poco más o menos de 4 a 5 centímetros de espesor.

Si se dispone de riego, es muy útil el *lanquear* ligeramente la tierra, dos o tres veces por semana. De lo contrario, hay necesidad de escoger épocas propicias, de no muy fuertes lluvias. El mes de abril ha sido entre nosotros el escogido para la siembra principal de frijoles.

Las desherbas son indicadas por el mayor o menor crecimiento de la maleza que brota en el cultivo. No se pueden precisar períodos de tiempo, sin cometer errores, pues en cultivos rápidos, como el de que tratamos, que no pasan de tres meses, sólo las circunstancias coincidentes muestran el momento en que debe verificarse la limpieza y ésta, hecha a tiempo oportuno, decide siempre del éxito de la siembra. «A mayor limpieza, mayor producción», es un axioma agrícola, conocido en todo el mundo.

Un aporque con poca tierra, lo más suelta posible, les conviene mucho a las matas de frijol, cuando empieza el desarrollo.

Observa un agricultor venezolano, muy experto en este cultivo, que los parajes donde sopla con frecuencia un viento frío, que no está en relación con la temperatura ambiente ordinaria, no son adecuados para sembrar frijoles, porque se marchitan las plantas fácilmente.

Continuará

JESUS DEL CORRAL
De La Revista Nat. de Agricultura.